

Дозировка

Нежеланите реакции могат да се сведат до минимум, като се използва най-ниската ефективна доза за възможно най-кратък период от време, необходим за контролиране на симптомите. Дозата трябва да се адаптира индивидуално в зависимост от клиничната картина. Общата дневна доза обикновено се разделя на два или три приема.

Дозировка: В зависимост от тежестта на заболяването, препоръчителната доза е между 1 и 3 капсули дневно, еквивалентни на 50 до 150 mg диклофенак натрий.

Възрастни и юноши на 18 и повече години: Препоръчителната доза за начална терапия е 100 до 150 mg диклофенак натрий (1 капсула 2 до 3 пъти дневно). Обикновено е достатъчна поддържаща доза от 1 капсула един до два пъти дневно. Не трябва да се надвишава максималната дневна доза от 3 капсули.

Пациенти с бъбречно увреждане: Не са провеждани проучвания за установяване на специфични препоръки за дозата. Диклофенак е противопоказан при пациенти с тежко бъбречно увреждане.

Пациенти с чернодробно увреждане: Не са провеждани проучвания за установяване на специфични препоръки за дозата. Диклофенак е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Пациенти в старческа възраст (на 65 и повече години): При пациентите в старческа възраст се изисква специално внимание поради потенциалното наличие на съпътстващо заболяване или тегло, по-ниско от нормалното. По-специално се препоръчва при пациенти в старческа възраст и с тегло, по-ниско от нормалното да се използва най-ниската ефективна доза.

Педиатрична популация: Геровит капсули не трябва да се прилага при деца и юноши на възраст под 18 години.

Противопоказания

- Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.
- Подобно на други НСПВС, диклофенак е противопоказан при пациенти с новопоявили се или увеличени астматични пристъпи, или с уртикария или остър ринит, след прием на ацетилсалицилова киселина или други НСВПС.
- Активна язва на стомаха или червата, или стомашно-чревен кръвоизлив или перфорация.
- Рецидивираща пептична язва/кръвоизлив (анамнеза за два или повече отделни епизода на доказана улцерация или кръвоизлив).
- Анамнеза за стомашно-чревен кръвоизлив или перфорация във връзка с предишна терапия с НСПВС.
- Хематологични заболявания (напр., нарушения на хематопоезата, костно-мозъчно увреждане, порфирия, хеморагична диатеза).
- Установена застойна сърдечна недостатъчност (клас II до IV съгласно NYHA).
- Ишемична болест на сърцето.
- Периферна артериална оклузивна болест и/или мозъчно-съдово заболяване.
- Мозъчно-съдов кръвоизлив.
- Остър тежък кръвоизлив.
- Тежка чернодробна или бъбречна недостатъчност.
- Трети триместър на бременността.
- Деца и юноши на възраст под 18 години (поради високото съдържание на витамини от група В).

Притежател на разрешение за употреба: **G.L. Pharma GmbH**

Представителство в България: **ТП „Джи Ел Фарма ГмбХ“ България,**

гр. София, бул. „България“ № 102, БЦ „Белисимо“, офис 64,

Т: 02/493 2000, Е: office@gl-pharma.bg

Лекарствен продукт по лекарско предписание!

Преди да предпишете лекарствения продукт, моля прочетете пълния текст на КХП.

Допълнителна **информация** можете да намерите на www.gl-pharma.com/bg

Геровит

Diclofenac sodium 50 mg/
Thiamine hydrochloride 50 mg/
Pyridoxine hydrochloride 50 mg/
Cyanocobalamin 0,25 mg

Заличи болката с комбинацията от Diclofenac + витамини B₁ B₆ B₁₂



Геровит

Diclofenac sodium 50 mg/
Thiamine hydrochloride 50 mg/
Pyridoxine hydrochloride 50 mg/
Cyanocobalamin 0,25 mg

Терапевтични показания:

При възрастни над 18 години при възпалителни заболявания, придружени с болка и възпалителни ревматоидни заболявания като:

- Хроничен полиартрит
- Анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев)
- Артроза
- Спондилоартрит
- Невралгии като цервикален синдром, лумбаго, ишиалгия

Предимства:

- Комбинираната терапия от Diclofenac с B-витамины има аналгетично преимущество, в сравнение с Diclofenac монотерапия при лечение на болка в кръста².
- Комбинацията от Diclofenac с B-витамины позволява достигане на ефективност с по-кратък курс на лечение и по-ниска дневна доза³.

Източници:

¹ КХП: Последно одобрена
² A Kuhlwein, HJ Meyer, CO Koehler- Reduced diclofenac administration by B vitamins: results of a randomized doubleblind study with reduced daily doses of diclofenac (75 mg diclofenac versus 75 mg diclofenac plus B vitamins) in acute lumbar vertebral syndromes, 1990 Jan 19;68(2):107-15
³ Carlos-Alberto Calderón-Ospina, Effect of Combined Diclofenac and B Vitamins (Thiamine, Pyridoxine, and Cyanocobalamin) for Low Back Pain Management: Systematic Review and Metaanalysis, Pain Medicine, 21(4), 2020, 766-781

Геровит

Diclofenac sodium 50 mg/
Thiamine hydrochloride 50 mg/
Pyridoxine hydrochloride 50 mg/
Cyanocobalamin 0,25 mg

Начин на приложение:

Перорално приложение.
Капсулите трябва да се поглъщат цели, с голямо количество течност, за предпочитане преди хранене.
Капсулите не трябва да се разделят или дъвчат.

Препоръчителна доза:

Начална доза:	Поддържаща доза:	Максимална доза:
1 капсула	1 капсула	3 капсули
2 - 3 x дневно	1 - 2 x дневно	дневно

Налична опаковка:

30 твърди капсули

