

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ:

Бевит Форте 100 mg/200 mg/200 микрограма филмирани таблетки. **КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ:** 1 филм. таблетка Бевит Форте съдържа: Тиаминов хидрохлорид (вит. В₁) 100 mg; Пиридоксинов хидрохлорид (вит. В₆) 200 mg; Цианокобаламин (вит. В₁₂) 200 микрограма. **ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:** За подпомагане на лечението на невропатии като: полиневропатии с различна етиология, неврит и невралгия, радикулит в резултат на дегенеративни заболявания на гръбначния мозък, интеркостална невралгия, тригеминална невралгия, ишиалгия, синдром „ръка-рамо“, лумбален синдром, цервикален синдром и пареза на фациалния нерв. **ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:** Обичайната доза е 1 таблетка 3 пъти дневно. Таблетките Бевит Форте трябва да се поглъщат без да се дъвчат, с малко количество течност, след хранене. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ:

Бевит Форте 100 mg/100 mg/1 mg – 2 ml инжекционен разтвор. **КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ:** 1 ампула от 2 ml съдържа: Тиаминов хидрохлорид (вит. В₁) 100 mg; Пиридоксинов хидрохлорид (вит. В₆) 100 mg; Цианокобаламин (вит. В₁₂) 1 mg. **ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА:** Инжекционен разтвор. **ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:** Неврологични нарушения, дължащи се на тежък дефицит на витамини В₁, В₆ и В₁₂, който не може да се коригира с перорално лечение. **ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:** При тежки (главно остри) случаи: в началото на лечението 1 ампула дневно до отзвучаване на симптомите. След отзвучаване на острия стадий: 1 ампула един до три пъти седмично. Педиатрична популация: Опитът при деца и юноши е ограничен, затова употребата на Бевит Форте инжекционен разтвор не се препоръчва. **Начин на приложение:** Интрамускулно. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества. **СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:** Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.



Притежател на разрешение за употреба: **G.L. Pharma GmbH**
Представителство в България: ТП „Джи Ел Фарма ГмбХ“ България,
гр. София, бул. „България“ № 102, БЦ „Белисимо“, офис 64,
Т: 02/493 2000, Е: office@gl-pharma.bg

Лекарствен продукт по лекарско предписание!

Преди да предпишете лекарствения продукт, моля прочетете пълния текст на КХП.

Допълнителна **информация** можете да намерите на www.gl-pharma.com/bg

Бевит Форте

В₁ (Thiamine hydrochloride) 100 mg/
В₆ (Pyridoxine hydrochloride) 200 mg/
В₁₂ (Cyanocobalamin) 200 µg


Бе-витализация на нервите



Бевит Форте

B₁ (Thiamine hydrochloride) 100 mg/
B₆ (Pyridoxine hydrochloride) 200 mg/
B₁₂ (Cyanocobalamin) 200 µg

Синергия на витамини B₁/B₆/B₁₂



Бевит Форте подпомага лечението на^{2,3}:

- Полиневропатии с различна етиология
- Неврит и невралгия
- Радикулит
- Интеркостална невралгия
- Тригеминална невралгия
- Цервикален синдром
- Пареза на фациалния нерв
- Синдром ръка-рамо
- Лумбален синдром
- Ишиалгия

Източници:

¹ Baltrusch, S. (2021). The Role of Neurotropic B Vitamins in Nerve Regeneration. BioMed Research International, 2021.,

² КХП филмирани таблетки: последно одобрена

³ КХП инжекционен разтвор: последно одобрена

Бевит Форте

B₁ (Thiamine hydrochloride) 100 mg/
B₆ (Pyridoxine hydrochloride) 200 mg/
B₁₂ (Cyanocobalamin) 200 µg

Схема на лечение

При тежки (остри) случаи




1 ампула дневно
до изчезване на
симптомите

или



1 таблетка
3 пъти дневно

След отзвучаване на острия стадий



1 ампула 1-3
пъти седмично
до изчезване на
симптомите

или



1 таблетка
3 пъти дневно

Предимства:

Витамините B₁, B₆, B₁₂ имат синергичен ефект върху нервната система и са необходими за нейното правилно функциониране¹.

Инжекционният разтвор:

- не съдържа бензилов алкохол³
- не съдържа лидокаин³.